

BOLEZNI, KI JIH PRENAŠAJO KLOPI

Pri nas je daleč najpogostejša lymfska borelioza, sledi pa ji klopni meningoencefalitis, proti kateremu se lahko učinkovito zaščitimo s cepljenjem. Strokovnjaki opozarjajo na previdnostne ukrepe, saj se s toplejšim vremenom prične tudi aktivnost kloпов, s tem pa se poveča verjetnost okužb, ki lahko resno ogrozijo naše zdravje.

Lymfska borelioza: - povzročajo jo bakterije, ki se imenujejo borelije

- cepiva ni
- zdravimo z antibiotiki

Znaki: rdečina, ki se pojavi nekaj dni do tednov po vbodu klopa, se počasi širi, na sredini blede in dobi obliko obroča, že v času kožnih sprememb ali pa v prvih mesecih po izginitvi se lahko pojavi prizadetost živčevja, sklepov ali srca.

Klopni meningoencefalitis: - je resno virusno vnetje osrednjega živčevja

- zaščitimo se s cepljenjem

Cepljenje proti klopnemu meningitisu se praviloma opravi s **trema odmerki cepiva**. Po prvem cepljenju izvedemo drugo po enem do treh mesecih in nato še tretje po devetih do dvanajstih mesecih. Prvo revakvacijo, "osvežitveno cepljenje", se z enim odmerkom opravi po treh letih, nato pa na pet let.

Znaki : prava faza bolezni se prične približno teden dni po vbodu s slabim počutjem, bolečinami v mišicah, glavobolom in vročino. Pri večini bolnikov se po vmesnem izboljšanju, ki traja od nekaj dni do treh tednov, pojavi druga faza bolezni, ki se kaže z visoko telesno temperaturo, močnim glavobolom, slabostjo, bruhanjem, tresenjem rok in jezika, včasih z motnjami zavesti in zbranosti.

Humana granulocitna anaplazmoza: - redkejša bolezen, ki jo prenašajo klopi pri nas

- ne moremo se zaščititi s cepljenjem
- zdravimo z antibiotiki

Znaki: povišana telesna temperatura, glavobol ter hude bolečine v sklepih in mišicah.

Zaščita pred klopi: zaščitimo se z oblačili (dolge hlače, dolgi rokavi, škornje, ruta), ki naj bodo svetle barve, da klopa lažje opazimo. Namažemo se z repelentom, katerega vonj odganja klope. Po vrnitvi iz narave natančno pregledamo telo, se stuširamo in umijemo glavo.

